

Μαθηματικό τυπολόγιο

Ορισμοί		Σειρές
$f(n) = O(g(n))$	ανν $\exists$ θετικοί c, n_0 ώστε $0 \leq f(n) \leq cg(n) \forall n \geq n_0$.	$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
$f(n) = \Omega(g(n))$	ανν $\exists$ θετικοί c, n_0 ώστε $f(n) \geq cg(n) \geq 0 \forall n \geq n_0$.	Γενικά:
$f(n) = \Theta(g(n))$	iff $f(n) = O(g(n))$ και $f(n) = \Omega(g(n))$.	$\sum_{i=1}^n i^m = \frac{1}{m+1} \left[(n+1)^{m+1} - 1 - \sum_{i=1}^n ((i+1)^{m+1} - i^{m+1} - (m+1)i^m) \right]$
$f(n) = o(g(n))$	ανν $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$.	$\sum_{i=1}^{n-1} i^m = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \binom{m+1}{k} B_k n^{m+1-k}$.
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$	ανν $\forall \epsilon > 0, \exists n_0$ ώστε $ a_n - a < \epsilon, \forall n \geq n_0$.	Γεωμετρικές σειρές:
$\sup S$	ο ελάχιστος $b \in \mathbb{R}$ ώστε $b \geq s, \forall s \in S$.	$\sum_{i=0}^{\infty} c^i = \frac{c^{n+1} - 1}{c - 1}, c \neq 1, \sum_{i=0}^{\infty} c^i = \frac{1}{1-c}, \sum_{i=1}^{\infty} c^i = \frac{c}{1-c}, c < 1,$
$\inf S$	ο μέγιστος $b \in \mathbb{R}$ ώστε $b \leq s, \forall s \in S$.	$\sum_{i=0}^{\infty} ic^i = \frac{nc^{n+2} - (n+1)c^{n+1} + c}{(c-1)^2}, c \neq 1, \sum_{i=0}^{\infty} ic^i = \frac{c}{(1-c)^2}, c < 1.$
$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \{a_i \mid i \geq n, i \in \mathbb{N}\}$.	Αρμονικές σειρές:
$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \{a_i \mid i \geq n, i \in \mathbb{N}\}$.	$H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, \sum_{i=1}^n iH_i = \frac{n(n+1)}{2}H_n - \frac{n(n-1)}{4}$.
$\binom{n}{k}$	Συνδυασμοί: Πλήθος k υποσυνόλων μεγέθους n συνόλου.	$\sum_{i=1}^n H_i = (n+1)H_n - n, \sum_{i=1}^n \binom{i}{m} H_i = \binom{n+1}{m+1} \left(H_{n+1} - \frac{1}{m+1} \right)$.
$[n]_k$	Αριθμοί Stirling (1 ^{ου} είδους): Διευθετήσεις συνόλου n στοιχείων σε k κύκλους.	1. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ 2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ 3. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
$[n]_k$	Αριθμοί Stirling (2 ^{ου} είδους): Διαμερίσεις συνόλου n στοιχείων σε k μη κενά σύνολα.	4. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$ 5. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$
$\langle n \rangle_k$	1 ^{ης} τάξης αριθμοί Euler: Μεταθέσεις των $n_1 n_2 \dots n_n$ στο $\{1, 2, \dots, n\}$ με k αυξήσεις.	6. $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$ 7. $\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$
$\langle\langle n \rangle\rangle_k$	2 ^{ης} τάξης αριθμοί Euler.	8. $\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$ 9. $\sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}$
c_n	Αριθμοί Catalan: Δυαδικά δέντρα με $n+1$ κορυφές.	10. $\binom{n}{k} = (-1)^k \binom{k-n-1}{k}$ 11. $\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1$ 12. $\begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix} = 2^{n-1} - 1$
14. $\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)!$ 15. $\begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix} = (n-1)!H_{n-1}$ 16. $\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1$ 17. $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ 18. $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$		19. $\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix}$ 20. $\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = n!$ 21. $c_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ 22. $\langle \frac{n}{0} \rangle = \langle \frac{n}{n-1} \rangle = 1$ 23. $\langle \frac{n}{k} \rangle = \langle \frac{n}{n-1-k} \rangle$
24. $\langle \frac{n}{k} \rangle = (k+1) \langle \frac{n-1}{k} \rangle + (n-k) \langle \frac{n-1}{k-1} \rangle$ 25. $\langle \frac{0}{k} \rangle = \begin{cases} 1 & \alpha\nu k=0, \\ 0 & \alpha\lambda\lambda\iota\omega\varsigma \end{cases}$ 26. $\langle \frac{n}{1} \rangle = 2^n - n - 1$		27. $\langle \frac{n}{2} \rangle = 3^n - (n+1)2^n + \binom{n+1}{2}$ 28. $x^n = \sum_{k=0}^n \langle \frac{n}{k} \rangle \binom{x+k}{n}$ 29. $\langle \frac{n}{m} \rangle = \sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} (m+1-k)^n (-1)^k$
30. $m! \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^n \langle \frac{n}{k} \rangle \binom{k}{n-m}$ 31. $\langle \frac{n}{m} \rangle = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \binom{n-k}{m} (-1)^{n-k-m} k!$ 32. $\langle\langle \frac{n}{0} \rangle\rangle = 1$ 33. $\langle\langle \frac{n}{n} \rangle\rangle = 0 \forall n \neq 0$		34. $\langle\langle \frac{n}{k} \rangle\rangle = (k+1) \langle\langle \frac{n-1}{k} \rangle\rangle + (2n-1-k) \langle\langle \frac{n-1}{k-1} \rangle\rangle$ 35. $\sum_{k=0}^n \langle\langle \frac{n}{k} \rangle\rangle = \frac{(2n)^n}{2^n}$ 36. $\begin{bmatrix} x \\ x-n \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^n \langle\langle \frac{n}{k} \rangle\rangle \binom{x+n-1-k}{2n}$
37. $\begin{bmatrix} n+1 \\ m+1 \end{bmatrix} = \sum_k \binom{n}{k} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} (m+1)^{n-k}$		

Μαθηματικό τυπολόγιο

Ταυτότητες (συνέχεια)

Δέντρα

$$38. \binom{n+1}{m+1} = \sum_k \binom{n}{k} \binom{k}{m} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{m} n^{n-k} = n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \binom{k}{m}$$

$$39. \begin{bmatrix} x \\ x-n \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^n \left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle \begin{bmatrix} x+k \\ 2n \end{bmatrix}$$

$$40. \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} = \sum_k \binom{n}{k} \begin{bmatrix} k+1 \\ m+1 \end{bmatrix} (-1)^{n-k}$$

$$41. \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} = \sum_k \begin{bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{bmatrix} \binom{k}{m} (-1)^{m-k}$$

$$42. \begin{bmatrix} m+n+1 \\ m \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^m k \begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix}$$

$$43. \begin{bmatrix} m+n+1 \\ m \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^m k(n+k) \begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix}$$

$$44. \binom{n}{m} = \sum_k \begin{bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} (-1)^{m-k}$$

$$45. (n-m)! \binom{n}{m} = \sum_k \begin{bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} (-1)^{m-k}, \text{ for } n \geq m$$

$$46. \begin{bmatrix} n \\ n-m \end{bmatrix} = \sum_k \binom{m-n}{m+k} \binom{m+n}{n+k} \begin{bmatrix} m+k \\ k \end{bmatrix}$$

$$47. \begin{bmatrix} n \\ n-m \end{bmatrix} = \sum_k \binom{m-n}{m+k} \binom{m+n}{n+k} \begin{bmatrix} m+k \\ k \end{bmatrix}$$

$$48. \begin{bmatrix} n \\ l+m \end{bmatrix} \binom{l+m}{l} = \sum_k \begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n-k \\ m \end{bmatrix} \binom{n}{k}$$

$$49. \begin{bmatrix} n \\ l+m \end{bmatrix} \binom{l+m}{l} = \sum_k \begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n-k \\ m \end{bmatrix} \binom{n}{k}.$$

Κάθε δέντρο n κορυφών έχει $n-1$ ακμές.

Ανισότητα Kraft: Αν το βάθος των φύλλων ενός δυαδικού δέντρου είναι $d_1, \dots, d_n$:

$$\sum_{i=1}^n 2^{-d_i} \leq 1,$$

και η ισότητα ισχύει αν κάθε εσωτερικός κόμβος έχει 2 απογόνους.

Αναδρομικές σχέσεις

Κύρια μέθοδος:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad a \geq 1, b > 1$$

Αν $\exists \epsilon > 0$ ώστε $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ τότε $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

Αν $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ τότε

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log_2 n).$$

Αν $\exists \epsilon > 0$ ώστε $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$, και $\exists c < 1$ ώστε $af(n/b) \leq cf(n)$ για μεγάλα n , τότε

$$T(n) = \Theta(f(n)).$$

Αντικατάσταση (παράδειγμα): Θεωρήστε την ακόλουθη αναδρομική σχέση

$$T_{i+1} = 2^{2^i} \cdot T_i^2, \quad T_1 = 2.$$

Παρατηρήστε ότι T_i είναι πάντα δύναμη του δύο. Έστω ότι $t_i = \log_2 T_i$. Τότε έχουμε

$$t_{i+1} = 2^i + 2t_i, \quad t_1 = 1.$$

Έστω ότι $u_i = t_i/2^i$. Διαιρώντας και τις δύο πλευρές της προηγούμενης με 2^{i+1} παίρνουμε

$$\frac{t_{i+1}}{2^{i+1}} = \frac{2^i}{2^{i+1}} + \frac{t_i}{2^i}.$$

Αντικαθιστώντας βρίσκουμε

$$u_{i+1} = \frac{1}{2} + u_i, \quad u_1 = \frac{1}{2},$$

που απλά είναι $u_i = i/2$. Έτσι βρίσκουμε ότι T_i έχει κλειστή μορφή $T_i = 2^{2^{i-1}}$.

Αθροίσμα παραγόντων (παράδ.): Θεωρήστε την αναδρομική σχέση

$$T(n) = 3T(n/2) + n, \quad T(1) = 1.$$

Μεταφέρουμε όλους τους όρους με T στα αριστερά

$$T(n) - 3T(n/2) = n.$$

Τώρα αναπτύξτε την αναδρομή και επιλέξτε έναν παράγοντα που κάνει την αριστερή πλευρά τηλεσκοπική.

$$1(T(n) - 3T(n/2)) = n$$

$$3(T(n/2) - 3T(n/4)) = n/2$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$3^{\log_2 n - 1}(T(2) - 3T(1)) = 2$$

Έστω ότι $m = \log_2 n$. Αθροίζοντας στα αριστερά παίρνουμε $T(n) - 3^m T(1) = T(n) - 3^m = T(n) - n^k$ όπου $k = \log_2 3 \approx 1,58496$. Αθροίζοντας στα δεξιά παίρνουμε

$$\sum_{i=0}^{m-1} \frac{n}{2^i} 3^i = n \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{3}{2}\right)^i.$$

Έστω ότι $c = \frac{3}{2}$. Τότε έχουμε

$$\begin{aligned} n \sum_{i=0}^{m-1} c^i &= n \left(\frac{c^m - 1}{c - 1} \right) \\ &= 2n(c^{\log_2 n} - 1) \\ &= 2n(c^{(k-1) \log_2 n} - 1) \\ &= 2n^k - 2n, \end{aligned}$$

και άρα $T(n) = 3n^k - 2n$. Πλήρεις αναδρομικές σχέσεις μπορούν να γραφτούν μερικώς ως εξής (παράδειγμα): Θεωρήστε την

$$T_i = 1 + \sum_{j=0}^{i-1} T_j, \quad T_0 = 1.$$

Παρατηρήστε ότι

$$T_{i+1} = 1 + \sum_{j=0}^i T_j.$$

Αφαιρώντας βρίσκουμε

$$\begin{aligned} T_{i+1} - T_i &= 1 + \sum_{j=0}^i T_j - 1 - \sum_{j=0}^{i-1} T_j \\ &= T_i. \end{aligned}$$

Άρα $T_{i+1} = 2T_i = 2^{i+1}$.

Γεννήτριες συναρτήσεις:

1. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με x^i .
2. Αθροίστε και τις δύο πλευρές ως προς τα i για τα οποία η εξίσωση είναι σωστή.
3. Επιλέξτε μια γεννήτρια συνάρτηση $G(x)$. Συνήθως $G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i g_i$.
4. Ξαναγράψτε την εξίσωση ως προς τη γεννήτρια συνάρτηση $G(x)$.
5. Λύστε ως προς $G(x)$.
6. Ο συντελεστής του x^i στη $G(x)$ είναι g_i .

Παράδειγμα:

$$g_{i+1} = 2g_i + 1, \quad g_0 = 0.$$

Πολλαπλασιάζουμε και αθροίζουμε:

$$\sum_{i \geq 0} g_{i+1} x^i = \sum_{i \geq 0} 2g_i x^i + \sum_{i \geq 0} x^i.$$

Επιλέγουμε $G(x) = \sum_{i \geq 0} x^i g_i$. Ξαναγράψουμε ως προς $G(x)$:

$$\frac{G(x) - g_0}{x} = 2G(x) + \sum_{i \geq 0} x^i.$$

Απλοποιούμε:

$$\frac{G(x)}{x} = 2G(x) + \frac{1}{1-x}.$$

Λύνουμε ως προς $G(x)$:

$$G(x) = \frac{x}{(1-x)(1-2x)}.$$

Αναπτύσσουμε χρησιμοποιώντας σε άθροισμα κλασμάτων:

$$\begin{aligned} G(x) &= x \left(\frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} \right) \\ &= x \left(2 \sum_{i \geq 0} 2^i x^i - \sum_{i \geq 0} x^i \right) \\ &= \sum_{i \geq 0} (2^{i+1} - 1) x^{i+1}. \end{aligned}$$

Οπότε $g_i = 2^i - 1$.

Μαθηματικό τυπολόγιο

$$\pi \approx 3,14159,$$

$$e \approx 2,71828,$$

$$\gamma \approx 0,57721,$$


$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,61803,$$

$$\hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,61803$$

i	2^i	p_i	General	Probability
1	2	2	Αριθμοί Bernoulli ($B_i = 0$, περιττό $i \neq 1$):	Συνεχείς κατανομές:
2	4	3	$B_0 = 1, B_1 = -\frac{1}{2}, B_2 = \frac{1}{6}, B_4 = -\frac{1}{30},$	Αν
3	8	5	$B_6 = \frac{1}{42}, B_8 = -\frac{1}{30}, B_{10} = \frac{5}{66}.$	$\mathbb{P}[a < X < b] = \int_a^b p(x) dx,$
4	16	7	Αλλαγή βάσης, τύπος τριωνύμου:	τότε p είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της X . Αν
5	32	11	$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}, \quad \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$	$\mathbb{P}[X < a] = P(a),$
6	64	13	Αριθμός Euler e :	τότε P είναι η συνάρτηση κατανομής της X . Αν υπάρχει και η P και η p τότε
7	128	17	$e = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$	$P(a) = \int_{-\infty}^a p(x) dx.$
8	256	19	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x.$	Μέση τιμή:
9	512	23	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$	Αν η X είναι διακριτή
10	1024	29	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e - \frac{e}{2n} + \frac{11e}{24n^2} - O\left(\frac{1}{n^3}\right).$	$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) \mathbb{P}[X = x].$
11	2048	31	Αρμονικοί αριθμοί:	Αν η X είναι συνεχής τότε
12	4096	37	$1, \frac{3}{2}, \frac{11}{6}, \frac{25}{12}, \frac{137}{60}, \frac{49}{20}, \frac{363}{140}, \frac{761}{280}, \frac{7129}{2520}, \dots$	$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dP(X).$
13	8192	41	$\ln n < H_n < \ln n + 1,$	Διακύμανση, τυπική απόκλιση:
14	16384	43	$H_n = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right).$	$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2,$
15	32768	47	Παραγοντικό, Προσέγγιση Stirling:	$\sigma = \sqrt{\text{Var}[X]}.$
16	65536	53	$1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, \dots$	Για τα ενδεχόμενα A και B :
17	131072	59	$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$	$\mathbb{P}[A \vee B] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] - \mathbb{P}[A \& B]$
18	262144	61	Συνάρτηση Ackermann και αντίστροφη:	$\mathbb{P}[A \& B] = \mathbb{P}[A] \cdot \mathbb{P}[B],$
19	524288	67	$a(i, j) = \begin{cases} 2^j & i = 1 \\ a(i-1, 2) & j=1 \\ a(i-1, a(i, j-1)) & i, j \geq 2 \end{cases}$	ανν A και B ανεξάρτητα.
20	1048576	71	$\alpha(i) = \min\{j \mid a(j, j) \geq i\}.$	$\mathbb{P}[A B] = \frac{\mathbb{P}[A \& B]}{\mathbb{P}[B]}$
21	2097152	73	Διωνυμική κατανομή:	Για τυχαίες μεταβλητές X και Y :
22	4194304	79	$\mathbb{P}[X = k] = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p,$	$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y],$
23	8388608	83	$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = np.$	αν X και Y ανεξάρτητες.
24	16777216	89	Κατανομή Poisson:	$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y],$
25	33554432	97	$\mathbb{P}[X = k] = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad \mathbb{E}[X] = \lambda.$	$\mathbb{E}[cX] = c\mathbb{E}[X].$
26	67108864	101	Κανονική (Γκαουσιανή) κατανομή:	Θεώρημα Bayes:
27	134217728	103	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \mathbb{E}[X] = \mu.$	$\mathbb{P}[A_i B] = \frac{\mathbb{P}[B A_i]\mathbb{P}[A_i]}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}[A_j]\mathbb{P}[B A_j]}.$
28	268435456	107	Ο «συλλέκτης κουπονιών»: Μας δίνουν ένα τυχαίο κουπόνι κάθε μέρα, και υπάρχουν n διαφορετικοί τύποι κουπονιών. Η κατανομή των κουπονιών είναι ομοιόμορφη. Το αναμενόμενο πλήθος ημερών για να συγκεντρώσουμε και τα n είδη είναι nH_n .	Εγκλεισμός-Αποκλεισμός:
29	536870912	109		$\mathbb{P}\left[\bigvee_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[X_i] +$
30	1073741824	113		$\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} \mathbb{P}\left[\bigwedge_{j=1}^k X_{i_j}\right].$
31	2147483648	127		Ανισότητες ροπών:
32	4294967296	131		$\mathbb{P}[X \geq \lambda \mathbb{E}[X]] \leq \frac{1}{\lambda},$
Pascal's Triangle				$\mathbb{P}[X - \mathbb{E}[X] \geq \lambda \cdot \sigma] \leq \frac{1}{\lambda^2}.$
	1			Γεωμετρική κατανομή:
	1 1			$\mathbb{P}[X = k] = pq^{k-1}, \quad q = 1 - p,$
	1 2 1			$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} kpq^{k-1} = \frac{1}{p}.$
	1 3 3 1			
	1 4 6 4 1			
	1 5 10 10 5 1			
	1 6 15 20 15 6 1			
	1 7 21 35 35 21 7 1			
	1 8 28 56 70 56 28 8 1			
	1 9 36 84 126 126 84 36 9 1			
	1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1			

Μαθηματικό τυπολόγιο

Τριγωνομετρία



Πυθαγόρειο Θεώρημα:

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ορισμοί:

$$\sin a = A/C, \quad \cos a = B/C, \quad \tan a = A/B, \\ \cot a = B/A, \quad \csc a = C/A, \quad \sec a = C/B.$$

Εμβαδόν, ακτίνα εγγεγραμμένου κύκλου:

$$\frac{1}{2}AB, \quad \frac{AB}{A+B+C}.$$

Ταυτότητες:

$$\sin x = \frac{1}{\csc x}, \quad \cos x = \frac{1}{\sec x}$$

$$\tan x = \frac{1}{\cot x}, \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \quad \sin x = \sin(\pi - x)$$

$$\cos x = -\cos(\pi - x), \quad \tan x = \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\cot x = -\cot(\pi - x), \quad \csc x = \cot \frac{x}{2} - \cot x$$

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}, \\ \cot(x \pm y) = \frac{\cot x \cot y \mp 1}{\cot x \pm \cot y}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x, \quad \cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}, \quad \cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x}$$

$$\sin(x + y) \sin(x - y) = \sin^2 x - \sin^2 y$$

$$\cos(x + y) \cos(x - y) = \cos^2 x - \sin^2 y.$$

Εξίσωση Euler:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{in} + 1 = 0.$$

Πίνακες

Πολλαπλασιασμός:

$$C = A \cdot B, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

Ορίζουσες:

$\det A \neq 0$ ανν A αντιστρέψιμος.

$$\det A \cdot B = \det A \cdot \det B,$$

$$\det A = \sum_{\pi} \prod_{i=1}^n \text{sign}(\pi) a_{i,\pi(i)}.$$

Ορίζουσα 2×2 και 3×3 :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc,$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = g \begin{bmatrix} b & c \\ e & f \end{bmatrix} - h \begin{bmatrix} a & c \\ d & f \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix} \\ = aei + bfg + cdh - ceg - fha - ibd.$$

Permanents:

$$\text{perm } A = \sum_{\pi} \prod_{i=1}^n a_{i,\pi(i)}.$$

Υπερβολικές συναρτήσεις

Ορισμοί:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \text{csch } x = \frac{2}{\sinh x},$$

$$\text{sech } x = \frac{2}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

Ταυτότητες:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad \tanh^2 x + \text{sech}^2 x = 1$$

$$\coth^2 x - \text{csch}^2 x = 1, \quad \sinh(-x) = -\sinh x$$

$$\cosh(-x) = \cosh x, \quad \tanh(-x) = -\tanh x$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x, \quad \cosh x + \sinh x = e^x$$

$$\cosh x - \sinh x = e^{-x}$$


$$(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$2 \sinh^2 \frac{x}{2} = \cosh x - 1, \quad 2 \cosh^2 \frac{x}{2} = \cosh x + 1$$

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	δεν ορίζεται

... στα Μαθηματικά δεν καταλαβαίνεις πράγματα, απλά συνηθίζεις σε αυτά.
- J. von Neumann

Περισσότερη Τριγ.



Νόμος των συνημιτόνων:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Εμβαδόν:

$$\text{Εμβαδόν} = \frac{1}{2}hc, \\ = \frac{1}{2}ab \sin C, \\ = \frac{c^2 \sin A \sin B}{2 \sin C}.$$

Τύπος του Ήρωνα:

$$\text{Εμβαδόν} = \sqrt{s \cdot s_a \cdot s_b \cdot s_c}, \\ s = \frac{1}{2}(a + b + c), \\ s_a = s - a, \\ s_b = s - b, \\ s_c = s - c.$$

Περισσότερες ταυτότητες:

$$\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}},$$

$$\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}},$$

$$\tan \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}},$$

$$= \frac{1 - \cos x}{\sin x},$$

$$= \frac{\sin x}{1 + \cos x},$$

$$\cot \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}},$$

$$= \frac{1 + \cos x}{\sin x},$$

$$= \frac{1 - \cos x}{\sin x},$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i},$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2},$$

$$\tan x = -i \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}},$$

$$= -i \frac{e^{2ix} - 1}{e^{2ix} + 1},$$


$$\sin x = \frac{\sinh ix}{i},$$

$$\cos x = \cosh ix,$$

$$\tan x = \frac{\tanh ix}{i}.$$

(συνεχίζεται σελ. 7)

Μαθηματικό τυπολόγιο

Θεωρία Αριθμών	Θεωρία Γράφων																																			
Το κινέζικο θεώρημα υπολοίπου: Υπάρχει αριθμός C ώστε: $\begin{aligned} C &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ &\vdots \\ C &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$ αν m_i και m_j είναι μεταξύ τους πρώτοι για $i \neq j$. Η συνάρτηση του Euler: $\phi(x)$ είναι ο αριθμός των θετικών ακεραίων μικρότεροι από x σχετικά πρώτοι με τον x. Αν $\prod_{i=1}^n p_i^{e_i}$ είναι παραγοντοποίηση σε πρώτους του x τότε $\phi(x) = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i-1} (p_i - 1).$ Θεώρημα Euler: Αν a και b μεταξύ τους πρώτοι, τότε $1 \equiv a^{\phi(b)} \pmod{b}.$ Θεώρημα Fermat: $1 \equiv a^{p-1} \pmod{p}.$ Ο Ευκλείδειος αλγόριθμος: αν $a > b$ ακέραιοι, τότε $\gcd(a, b) = \gcd(a \bmod b, b).$ Αν $\prod_{i=1}^n p_i^{e_i}$ η παραγοντοποίηση σε πρώτους του x τότε $S(x) = \sum_{d x} d = \prod_{i=1}^n \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}.$ Τέλειοι Αριθμοί: Ο x είναι τέλειος άρτιος αριθμός αν $x = 2^{n-1}(2^n - 1)$ και ο $2^n - 1$ είναι πρώτος. Θεώρημα Wilson: ο n είναι πρώτος αν $(n - 1)! \equiv -1 \pmod{n}$. Αντιστροφή Möbius: $\mu(i) = \begin{cases} 1 & \text{αν } i = 1. \\ 0 & \text{το } i \text{ έχει τετράγωνο.} \\ (-1)^r & \text{το } i \text{ είναι γινόμενο } ir \text{ διακεκριμένων πρώτων.} \end{cases}$ Αν $G(a) = \sum_{d a} F(d),$ τότε $F(a) = \sum_{d a} \mu(d) G\left(\frac{a}{d}\right).$ Πρώτοι αριθμοί: $\begin{aligned} p_n &= n \ln n + n \ln \ln n - n + n \frac{\ln \ln n}{\ln n} \\ &\quad + O\left(\frac{n}{\ln n}\right), \\ n(n) &= \frac{n}{\ln n} + \frac{n}{(\ln n)^2} + \frac{2!n}{(\ln n)^3} \\ &\quad + O\left(\frac{n}{(\ln n)^4}\right). \end{aligned}$	Ορισμοί: Βρόγχος Ακμή που συνδέει μια κορυφή με τον εαυτό της. Κατευθυνόμενος Κάθε ακμή έχει κατεύθυνση. Απλό Γράφος χωρίς βρόγχους ή ακμές με πολλαπλότητα. Περίπατος Μια ακολουθία $v_0 e_1 v_1 \dots e_l v_l$. Διαδρομή Περίπατος με διακριτές κορυφές. Μονοπάτι Διαδρομή με διακριτές κορυφές. Συνεκτικό Γράφος με διαδρομές ανάμεσα σε κάθε δύο κορυφές. Συνιστώσα Μεγιστικός συνεκτικός υπογράφος. Δέντρο Συνεκτικός ακυκλικός γράφος. Ελεύθερο δέντρο Δένδρο χωρίς ρίζα. ΚΑΓ Κατευθυνόμενος ακυκλικός γράφος. Eulerian Γράφος με μια διαδρομή που περνάει από κάθε κορυφή μία φορά. Hamiltonian Γράφος με κύκλο που περνάει από κάθε κορυφή μία φορά. Cut Σύνολο ακμών που αν αφαιρεθεί αυξάνεται ο αριθμός των συνιστωσών. Cut-set Ελαχιστικό cut. Cut edge Cut μεγέθους 1. k-Συνεκτικό Γράφος συνεκτικός μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε $k - 1$ κορυφών. k-Tough $\forall S \subseteq V, S \neq \emptyset$ έχουμε $k \cdot c(G - S) \leq S$. k-Κανονικό Γράφος με όλες τις κορυφές του βαθμού k. k-Παράγοντας k-κανονικός παράγων υπογράφος. Matching Σύνολο ακμών, που δεν έχει δύο διαδοχικές ακμές. Κλίκα Σύνολο κορυφών, που όλες είναι διαδοχικές. Ind. set Σύνολο κορυφών, που δεν έχει διαδοχικές κορυφές. Κάλυμμα Κορυφών Σύνολο κορυφών που καλύπτουν όλες τις ακμές. Επίπεδος γράφος Γράφος που μπορεί να εμφυτευτεί στο επίπεδο. Γράφος επιπέδου Εμφύτευση επιπέδου γράφου. $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$ Αν G επίπεδος τότε $n - m + f = 2$, οπότε $f \leq 2n - 4, \quad m \leq 3n - 6.$ Κάθε επίπεδος γράφος έχει κορυφή βαθμού ≤ 5.	Συμβολισμός: <table><tr><td>$E(G)$</td><td>Σύνολο ακμών</td></tr><tr><td>$V(G)$</td><td>Σύνολο κορυφών</td></tr><tr><td>$c(G)$</td><td>Πλήθος συνιστωσών</td></tr><tr><td>$G[S]$</td><td>Επαγόμε. υπογράφος</td></tr><tr><td>$\deg(v)$</td><td>Βαθμός της v</td></tr><tr><td>$\Delta(G)$</td><td>Μέγιστος βαθμός</td></tr><tr><td>$\delta(G)$</td><td>Ελάχιστος βαθμός</td></tr><tr><td>$\chi(G)$</td><td>Χρωματικός αριθμός</td></tr><tr><td>$\chi_E(G)$</td><td>Χρωμ. αριθμός ακμών</td></tr><tr><td>G^c</td><td>Συμπληρωματικός γρ.</td></tr><tr><td>K_n</td><td>Πλήρης γράφος</td></tr><tr><td>K_{n_1, n_2}</td><td>Πλήρης bipartite γρ.</td></tr><tr><td>$r(k, l)$</td><td>Αριθμός Ramsey</td></tr></table> Γεωμετρία Προβολικές συντεταγμένες: τριάδες (x, y, z), όχι όλα τα x, y, z μηδέν. $(x, y, z) = (cx, cy, cz) \quad \forall c \neq 0.$ <table><tr><th>Καρτεσιανές</th><th>Προβολικές</th></tr><tr><td>(x, y)</td><td>$(x, y, 1)$</td></tr><tr><td>$y = mx + b$</td><td>$(m, -1, b)$</td></tr><tr><td>$x = c$</td><td>$(1, 0, -c)$</td></tr></table> Τύπος απόστασης, μετρικές L_p και L_∞: $\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2},$ $[x_1 - x_0 ^p + y_1 - y_0 ^p]^{1/p},$ $\lim_{p \rightarrow \infty} [x_1 - x_0 ^p + y_1 - y_0 ^p]^{1/p}.$ Εμβαδόν τριγώνου (x_0, y_0), (x_1, y_1) και (x_2, y_2): $\frac{1}{2} \text{abs} \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 \end{vmatrix}.$ Γωνία σχηματιζόμενη από 3 σημεία:  $\cos \theta = \frac{(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)}{l_1 l_2}.$ Ευθεία από δύο σημεία (x_0, y_0) και (x_1, y_1): $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_0 & y_0 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$ Εμβαδόν κύκλου, όγκος σφαίρας: $A = \pi r^2, \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3.$ Αν έχω δει πιο μακριά από άλλους είναι γιατί στάθηκα σε ώμους γιγάντων. – Issac Newton	$E(G)$	Σύνολο ακμών	$V(G)$	Σύνολο κορυφών	$c(G)$	Πλήθος συνιστωσών	$G[S]$	Επαγόμε. υπογράφος	$\deg(v)$	Βαθμός της v	$\Delta(G)$	Μέγιστος βαθμός	$\delta(G)$	Ελάχιστος βαθμός	$\chi(G)$	Χρωματικός αριθμός	$\chi_E(G)$	Χρωμ. αριθμός ακμών	G^c	Συμπληρωματικός γρ.	K_n	Πλήρης γράφος	K_{n_1, n_2}	Πλήρης bipartite γρ.	$r(k, l)$	Αριθμός Ramsey	Καρτεσιανές	Προβολικές	(x, y)	$(x, y, 1)$	$y = mx + b$	$(m, -1, b)$	$x = c$	$(1, 0, -c)$
$E(G)$	Σύνολο ακμών																																			
$V(G)$	Σύνολο κορυφών																																			
$c(G)$	Πλήθος συνιστωσών																																			
$G[S]$	Επαγόμε. υπογράφος																																			
$\deg(v)$	Βαθμός της v																																			
$\Delta(G)$	Μέγιστος βαθμός																																			
$\delta(G)$	Ελάχιστος βαθμός																																			
$\chi(G)$	Χρωματικός αριθμός																																			
$\chi_E(G)$	Χρωμ. αριθμός ακμών																																			
G^c	Συμπληρωματικός γρ.																																			
K_n	Πλήρης γράφος																																			
K_{n_1, n_2}	Πλήρης bipartite γρ.																																			
$r(k, l)$	Αριθμός Ramsey																																			
Καρτεσιανές	Προβολικές																																			
(x, y)	$(x, y, 1)$																																			
$y = mx + b$	$(m, -1, b)$																																			
$x = c$	$(1, 0, -c)$																																			

Μαθηματικό τυπολόγιο

π	Απειροστικός Λογισμός
Ταυτότητα Wallis: $\pi = 2 \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \dots}$ Ανάπτυγμα σε συνεχή κλάσματα του Brouncker: $\frac{\pi}{4} = 1 + \frac{1^2}{2 + \frac{3^2}{2 + \frac{5^2}{2 + \frac{7^2}{2 + \dots}}}}$ Σειρά Gregory: $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots$ Σειρά Newton: $\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 2^3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2^5} + \dots$ Σειρά Sharp: $\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{3^1 \cdot 3} + \frac{1}{3^2 \cdot 5} - \frac{1}{3^3 \cdot 7} + \dots \right)$ Σειρές Euler: $\frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots$ $\frac{\pi^2}{8} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \dots$ $\frac{\pi^2}{12} = \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \dots$	Παράγωγοι: $\frac{d(cu)}{dx} = c \frac{du}{dx}$ $\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$ $\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ $\frac{d(u^n)}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(u/v)}{dx} = \frac{v \left(\frac{du}{dx} \right) - u \left(\frac{dv}{dx} \right)}{v^2}$ $\frac{d(e^{cu})}{dx} = ce^{cu} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(c^u)}{dx} = (\ln c) c^u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\ln u)}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\sin u)}{dx} = \cos u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\cos u)}{dx} = -\sin u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\tan u)}{dx} = \sec^2 u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\cot u)}{dx} = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\sec u)}{dx} = \tan u \sec u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\csc u)}{dx} = -\cot u \csc u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\arcsin u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\arccos u)}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\arctan u)}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arccot} u)}{dx} = \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arcsec} u)}{dx} = \frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arccsc} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\sinh u)}{dx} = \cosh u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\cosh u)}{dx} = \sinh u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\tanh u)}{dx} = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\coth u)}{dx} = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{sech} u)}{dx} = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{csch} u)}{dx} = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arcsinh} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arccosh} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arctanh} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arccoth} u)}{dx} = \frac{1}{u^2-1} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arcsech} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$ $\frac{d(\operatorname{arcsch} u)}{dx} = \frac{-1}{ u \sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$ Ολοκληρώματα: $\int cu \, dx = c \int u \, dx$ $\int (u+v) \, dx = \int u \, dx + \int v \, dx$ $\int x^n \, dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}, \quad n \neq -1$ $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x$ $\int e^x \, dx = e^x$ $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$ $\int u \frac{dv}{dx} \, dx = uv - \int v \frac{du}{dx} \, dx$ $\int \sin x \, dx = -\cos x$ $\int \cos x \, dx = \sin x$ $\int \tan x \, dx = -\ln \cos x$ $\int \cot x \, dx = \ln \cos x$ $\int \sec x \, dx = \ln \sec x + \tan x$ $\int \csc x \, dx = \ln \csc x + \cot x$ $\int \arcsin \frac{x}{a} \, dx = \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0$
Απλά κλάσματα Έστω ότι $N(x)$ και $D(x)$ πολυωνυμικές συναρτήσεις του x. Μπορούμε να αναλύσουμε το $N(x)/D(x)$ σε απλά κλάσματα. Πρώτα, αν ο βαθμός του N είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το βαθμό του D, διαιρούμε το N με το D, βρίσκοντας $\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{N'(x)}{D(x)},$ όπου ο βαθμός του N' είναι μικρότερος του βαθμού του D. Μετά, παραγοντοποιούμε το $D(x)$. Χρησιμοποιούμε τους εξής κανόνες: Για μη επαναλαμβανόμενο παράγοντα: $\frac{N(x)}{(x-a)D(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{N'(x)}{D(x)},$ όπου $A = \left[\frac{N(x)}{D(x)} \right]_{x=a}.$ Για επαναλαμβανόμενο παράγοντα: $\frac{N(x)}{(x-a)^m D(x)} = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{A_k}{(x-a)^{m-k}} + \frac{N'(x)}{D(x)},$ όπου $A_k = \frac{1}{k!} \left[\frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{N(x)}{D(x)} \right) \right]_{x=a}.$	
Ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζει τον εαυτό του στον κόσμο· ο μη λογικός επιμένει να προσαρμόσει τον κόσμο στον εαυτό του. Συνεπώς όλη η πρόοδος βασίζεται στον μη λογικό. – George Bernard Shaw	

Μαθηματικό τυπολόγιο

Απειροστικός Λογισμός (συνέχεια)

$$15. \int \arccos \frac{x}{a} dx = \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0$$

$$16. \int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2), \quad a > 0$$

$$17. \int \sin^2(ax) dx = \frac{1}{2a}(ax - \sin(ax) \cos(ax))$$

$$18. \int \cos^2(ax) dx = \frac{1}{2a}(ax + \sin(ax) \cos(ax))$$

$$19. \int \sec^2 x dx = \tan x$$

$$20. \int \csc^2 x dx = -\cot x$$

$$21. \int \sin^n x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$$

$$22. \int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$$

$$23. \int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx, \quad n \neq 1$$

$$24. \int \cot^n x dx = -\frac{\cot^{n-1} x}{n-1} - \int \cot^{n-2} x dx, \quad n \neq 1$$

$$25. \int \sec^n x dx = \frac{\tan x \sec^{n-1} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx, \quad n \neq 1$$

$$26. \int \csc^n x dx = -\frac{\cot x \csc^{n-1} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} x dx, \quad n \neq 1$$

$$27. \int \sinh x dx = \cosh x$$

$$28. \int \cosh x dx = \sinh x$$

$$29. \int \tanh x dx = \ln |\cosh x|$$

$$30. \int \coth x dx = \ln |\sinh x|$$

$$31. \int \operatorname{sech} x dx = \arctan \sinh x$$

$$32. \int \operatorname{csch} x dx = \ln \left| \tanh \frac{x}{2} \right|$$

$$33. \int \sinh^2 x dx = \frac{1}{4} \sinh(2x) - \frac{1}{2} x$$

$$34. \int \cosh^2 x dx = \frac{1}{4} \sinh(2x) + \frac{1}{2} x$$

$$35. \int \operatorname{sech}^2 x dx = \tanh x$$

$$36. \int \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} dx = x \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 + a^2}, \quad a > 0$$

$$37. \int \operatorname{arctanh} \frac{x}{a} dx = x \operatorname{arctanh} \frac{x}{a} + \frac{a}{2} \ln |a^2 - x^2|$$

$$38. \int \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} dx = \begin{cases} x \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 - a^2}, & \alpha \nu \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} > 0 \text{ και } a > 0, \\ x \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} + \sqrt{x^2 - a^2}, & \alpha \nu \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} < 0 \text{ και } a > 0, \end{cases}$$

$$39. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}), \quad a > 0$$

$$40. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$41. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$42. \int (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{x}{8} (5a^2 - 2x^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$43. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$44. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$45. \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$46. \int \sqrt{a^2 \pm x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 \pm x^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{a^2 \pm x^2}|$$

$$47. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}|, \quad a > 0$$

$$48. \int \frac{dx}{ax^2 + bx} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{x}{a + bx} \right|$$

$$49. \int x \sqrt{a + bx} dx = \frac{2(3bx - 2a)(a + bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$50. \int \frac{\sqrt{a + bx}}{x} dx = 2\sqrt{a + bx} + a \int \frac{1}{x\sqrt{a + bx}} dx$$

$$51. \int \frac{x}{\sqrt{a + bx}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{a + bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a + bx} + \sqrt{a}} \right|, \quad a > 0$$

$$52. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$53. \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} (a^2 - x^2)^{3/2}$$

$$54. \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$55. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$56. \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$57. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$58. \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 + x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$59. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{|x|}, \quad a > 0$$

$$60. \int x \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2}$$

$$61. \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{x}{a + \sqrt{a^2 + x^2}} \right|$$

Περσσότερη τριγωνομετρία (συνέχεια από τη σελ. 4)

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) + \cos(x+y))$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x-y) + \sin(x+y))$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos(2x))$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos(2x))$$

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin(3x)$$

$$\cos^3 x = \frac{3}{4} \cos x + \frac{1}{4} \cos(3x)$$

$$\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{8} \cos(4x)$$

$$\cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{8} \cos(4x)$$

$$\sin^{2n-1} x = \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-2}} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{2n-1}{k} \sin((2n-2k-1)x)$$

$$\cos^{2n-1} x = \frac{1}{2^{2n-2}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-1}{k} \cos((2n-2k-1)x)$$

$$\sin^{2n} x = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} + \frac{(-1)^n}{2^{2n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{2n}{k} \cos(2(n-k)x)$$

$$\cos^{2n} x = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} + \frac{1}{2^{2n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} \cos(2(n-k)x)$$

Μαθηματικό τυπολόγιο

Απειροστικός Λογισμός (συνέχεια)

$$62. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{|x|}, \quad a > 0$$

$$63. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \mp \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{a^2 x}$$

$$64. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \sqrt{x^2 \pm a^2}$$

$$65. \int \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{x^4} dx = \mp \frac{(x^2 + a^2)^{3/2}}{3a^2 x^3}$$

$$66. \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right|, & \text{αν } b^2 > 4ac, \\ \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}}, & \text{αν } b^2 < 4ac, \end{cases}$$

$$67. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right|, & \text{αν } a > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \frac{-2ax - b}{\sqrt{b^2 - 4ac}}, & \text{αν } a < 0, \end{cases}$$

$$68. \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{4ac - b^2}{8a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$69. \int \frac{x dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$70. \int \frac{dx}{x\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{-1}{\sqrt{c}} \ln \left| \frac{2\sqrt{c}\sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right|, & \text{αν } c > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-c}} \arcsin \frac{bx + 2c}{|x|\sqrt{b^2 - 4ac}}, & \text{αν } c < 0, \end{cases}$$

$$71. \int x^3 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \left(\frac{1}{3} x^2 - \frac{2}{15} a^2 \right) (x^2 + a^2)^{3/2}$$

$$72. \int x^n \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} x^n \cos(ax) + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos(ax) dx$$

$$73. \int x^n \cos(ax) dx = \frac{1}{a} x^n \sin(ax) - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin(ax) dx$$

$$74. \int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$$

$$75. \int x^n \ln(ax) dx = x^{n+1} \left(\frac{\ln(ax)}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

$$76. \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln ax)^m - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx.$$

$$x^1 = x^1$$

$$= x^{\bar{1}}$$

$$x^2 = x^2 + x^1$$

$$= x^{\bar{2}} - x^{\bar{1}}$$

$$x^3 = x^3 + 3x^2 + x^1$$

$$= x^{\bar{3}} - 3x^{\bar{2}} + x^{\bar{1}}$$

$$x^4 = x^4 + 6x^3 + 7x^2 + x^1$$

$$= x^{\bar{4}} - 6x^{\bar{3}} + 7x^{\bar{2}} - x^{\bar{1}}$$

$$x^5 = x^5 + 15x^4 + 25x^3 + 10x^2 + x^1$$

$$= x^{\bar{5}} - 15x^{\bar{4}} + 25x^{\bar{3}} - 10x^{\bar{2}} + x^{\bar{1}}$$

$$x^{\bar{1}} = x^1$$

$$x^1 = x^1$$

$$x^{\bar{2}} = x^2 + x^1$$

$$x^{\bar{2}} = x^2 - x^1$$

$$x^{\bar{3}} = x^3 + 3x^2 + 2x^1$$

$$x^{\bar{3}} = x^3 - 3x^2 + 2x^1$$

$$x^{\bar{4}} = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x^1$$

$$x^{\bar{4}} = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x^1$$

$$x^{\bar{5}} = x^5 + 10x^4 + 35x^3 + 50x^2 + 24x^1$$

$$x^{\bar{5}} = x^5 - 10x^4 + 35x^3 - 50x^2 + 24x^1$$

Λογισμός μεταβολών

Διαφορά, τελεστές ολίσθησης:

$$\Delta f(x) = f(x+1) - f(x),$$

$$\mathbb{E}f(x) = f(x+1).$$

Θεμελιώδες θεώρημα:

$$f(x) = \Delta F(x) \Leftrightarrow \sum f(x) \delta x = F(x) + C.$$

$$\sum_a^b f(x) \delta x = \sum_{i=a}^{b-1} f(i).$$

Διαφορές:

$$\Delta(cu) = c\Delta u$$

$$\Delta(u+v) = \Delta u + \Delta v$$

$$\Delta(uv) = u\Delta v + \mathbb{E}v\Delta u$$

$$\Delta(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\Delta(H_x) = x^{-1}$$

$$\Delta(2^x) = 2^x$$

$$\Delta(c^x) = (c-1)c^x$$

$$\Delta\left(\begin{matrix} x \\ m \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} x \\ m-1 \end{matrix}\right).$$

Αθροίσματα:

$$\sum cu \delta x = c \sum u \delta x$$

$$\sum (u+v) \delta x = \sum u \delta x + \sum v \delta x$$

$$\sum u\Delta v \delta x = uv - \sum \mathbb{E}v\Delta u \delta x$$

$$\sum x^n \delta x = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\sum x^{-1} \delta x = H_x$$

$$\sum c^x \delta x = \frac{c^x}{c-1}$$

$$\sum \left(\begin{matrix} x \\ m \end{matrix}\right) \delta x = \left(\begin{matrix} x \\ m+1 \end{matrix}\right).$$

Φθίνουσες παραγοντικές δυνάμεις:

$$x^n = x(x-1) \cdots (x-n+1), \quad n > 0,$$

$$x^0 = 1,$$

$$x^n = \frac{1}{(x+1) \cdots (x+|n|)}, \quad n < 0,$$

$$x^{\overline{n+m}} = x^{\overline{m}}(x-m)^{\overline{n}}.$$

Αύξουσες παραγοντικές δυνάμεις:

$$x^{\bar{n}} = x(x+1) \cdots (x+n-1), \quad n > 0,$$

$$x^{\bar{0}} = 1,$$

$$x^{\bar{n}} = \frac{1}{(x-1) \cdots (x-|n|)}, \quad n < 0,$$

$$x^{\overline{n+m}} = x^{\overline{m}}(x+m)^{\overline{n}}.$$

Μετατροπή:

$$x^n = (-1)^n (-x)^{\bar{n}} = (x-n+1)^{\bar{n}} = 1/(x+1)^{-\bar{n}},$$

$$x^{\bar{n}} = (-1)^n (-x)^n = (x+n-1)^n = 1/(x-1)^{-n},$$

$$x^n = \sum_{k=1}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] x^k = \sum_{k=1}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} x^{\bar{k}},$$

$$x^{\bar{n}} = \sum_{k=1}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} x^k,$$

$$x^{\bar{n}} = \sum_{k=1}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] x^{\bar{k}}.$$

Μαθηματικό τυπολόγιο

Σειρές

Σειρές Taylor:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2}f''(a) + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(x-a)^i}{i!} f^{(i)}(a).$$

Αναπτύγματα:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} x^i, \\ \frac{1}{1-cx} &= 1 + cx + c^2x^2 + c^3x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} c^i x^i, \\ \frac{1}{1-x^n} &= 1 + x^n + x^{2n} + x^{3n} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} x^{ni}, \\ \frac{x}{(1-x)^2} &= x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} ix^i, \\ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{k!z^k}{(1-z)^{k+1}} &= x + 2^n x^2 + 3^n x^3 + 4^n x^4 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} i^n x^i, \\ e^x &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}, \\ \ln(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \frac{x^i}{i}, \\ \ln \frac{1}{1-x} &= x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x^i}{i}, \\ \sin x &= x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}, \\ \cos x &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}, \\ \tan^{-1} x &= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)}, \\ (1+x)^n &= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n}{i} x^i, \\ \frac{1}{(1-x)^{n+1}} &= 1 + (n+1)x + \binom{n+2}{2}x^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+n}{i} x^i, \\ \frac{x}{e^x-1} &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{720}x^4 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{B_i x^i}{i!}, \\ \frac{1}{2x}(1-\sqrt{1-4x}) &= 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i+1} \binom{2i}{i} x^i, \\ \frac{1}{\sqrt{1-4x}} &= 1 + 2x + 6x^2 + 20x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{2i}{i} x^i, \\ \frac{1}{\sqrt{1-4x}} \left(\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} \right)^n &= 1 + (2+n)x + \binom{4+n}{2}x^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{2i+n}{i} x^i, \\ \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} &= x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 + \frac{25}{12}x^4 + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} H_i x^i, \\ \frac{1}{2} \left(\ln \frac{1}{1-x} \right)^2 &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x^3 + \frac{11}{24}x^4 + \dots = \sum_{i=2}^{\infty} \frac{H_{i-1} x^i}{i}, \\ \frac{x}{1-x-x^2} &= x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} F_i x^i, \\ \frac{F_n x}{1-(F_{n-1}+F_{n+1})x-(-1)^n x^2} &= F_n x + F_{2n} x^2 + F_{3n} x^3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} F_{ni} x^i. \end{aligned}$$

Συνήθεις δυνάμωσειρές:

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

Εκθετικές δυνάμωσειρές:

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \frac{x^i}{i!}.$$

Δυνάμωσειρές Dirichlet:

$$A(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{i^x}.$$

Διωνυμικό θεώρημα:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Διαφορές ίδιων δυνάμεων:

$$x^n - y^n = (x-y) \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k.$$

Για συνήθεις δυνάμωσειρές:

$$\alpha A(x) + \beta B(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (\alpha a_i + \beta b_i) x^i,$$

$$x^k A(x) = \sum_{i=k}^{\infty} a_{i-k} x^i,$$

$$\frac{A(x) - \sum_{i=0}^{k-1} a_i x^i}{x^k} = \sum_{i=0}^{\infty} a_{i+k} x^i,$$

$$A(cx) = \sum_{i=0}^{\infty} c^i a_i x^i,$$

$$A'(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) a_{i+1} x^i,$$

$$xA'(x) = \sum_{i=1}^{\infty} i a_i x^i,$$

$$\int A(x) dx = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_{i-1}}{i} x^i,$$

$$\frac{A(x) + A(-x)}{2} = \sum_{i=0}^{\infty} a_{2i} x^{2i},$$

$$\frac{A(x) - A(-x)}{2} = \sum_{i=0}^{\infty} a_{2i+1} x^{2i+1}.$$

Άθροιση: Αν $b_i = \sum_{j=0}^i a_j$ τότε

$$B(x) = \frac{1}{1-x} A(x).$$

Συνέλιξη:

$$A(x)B(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right) x^i.$$

Ο Θεός έφτιαξε τους φυσικούς αριθμούς· όλα τα άλλα είναι έργα του ανθρώπου.
– Leopold Kronecker

Διανυσματική Ανάλυση

Στροβιλισμός: $\text{curl} F = \nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$, απόκλιση: $\text{div} F = \langle \nabla, F \rangle = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$, όπου $F = (F_1, F_2, F_3) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Stokes: $\oint_S \nabla \times F = \oint_{\partial S} F$, όπου S κατά τμήματα C^2 φραγμένη προσανατολισμένη επιφάνεια στον $\mathbb{R}^3$ με θετικά προσανατολισμένο σύνορο ∂S το οποίο είναι απλή κλειστή κατά τμήματα C^1 καπύλη, και $F : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια C^1 συνάρτηση.

Green: $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} F$, όπου D με τις ίδιες ιδιότητες όπως η S του Stokes, αλλά επιπλέον $D \subseteq \mathbb{R}^2$, και $F = (P, Q) : S \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Gauss: $\iiint_{\Omega} \langle \nabla, F \rangle = \iint_{\partial \Omega} F$, όπου $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$, κλειστό φραγμένο με κατά τμήματα C^2 θετικά προσανατολισμένο σύνορο $\partial \Omega$ και F είναι C^1 στο Ω .


Μαθηματικό τυπολόγιο

Σειρές

Αναπτύγματα:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^{n+1}} \ln \frac{1}{1-x} &= \sum_{i=0}^{\infty} (H_{n+i} - H_n) \binom{n+i}{i} x^i, & \left(\frac{1}{x}\right)^{-n} &= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i}{n} x^i, \\ x^{\bar{n}} &= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n}{i} x^i, & (e^x - 1)^n &= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i}{n} \frac{n! x^i}{i!}, \\ \left(\ln \frac{1}{1-x}\right)^n &= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i}{n} \frac{n! x^i}{i!}, & x \cot x &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-4)^i B_{2i} x^{2i}}{(2i)!}, \\ \tan x &= \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i-1} \frac{2^{2i} (2^{2i}-1) B_{2i} x^{2i-1}}{(2i)!}, & \zeta(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^x}, \\ \frac{1}{\zeta(x)} &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mu(i)}{i^x}, & \frac{\zeta(x-1)}{\zeta(x)} &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\phi(i)}{i^x}, \\ \zeta(x) &= \prod_p \frac{1}{1-p^{-x}}, \\ \zeta^2(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{d(i)}{i^x} \quad \text{όπου } d(n) = \sum_{d|n} 1, \\ \zeta(x)\zeta(x-1) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{s(i)}{i^x} \quad \text{όπου } s(n) = \sum_{d|n} d, \\ \zeta(2n) &= \frac{2^{2n-1} |B_{2n}|}{(2n)!} \pi^{2n}, \quad n \in \mathbb{N}, \\ \frac{x}{\sin x} &= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^{i-1} \frac{(4^i-2) B_{2i} x^{2i}}{(2i)!}, \\ \left(\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}\right)^n &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{n(2i+n-1)!}{i!(n+i)!} x^i, \\ e^x \sin x &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2^{i/2} \sin \frac{i\pi}{4}}{i!} x^i, \\ \frac{\sqrt{1-\sqrt{1-x}}}{x} &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(4i)!}{16^i \sqrt{2} (2i)! (2i+1)!} x^i, \\ \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2 &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{4^i i^2}{(i+1)(2i+1)!} x^{2i}. \end{aligned}$$

Το αδύνατο τούβλο του Escher



Ολοκλήρωση Stieltjes

Αν η G είναι συνεχής στο διάστημα $[a, b]$ και F είναι φθίνουσα, τότε το

$$\int_a^b G(x) dF(x)$$

υπάρχει. Αν $a \leq b \leq c$ τότε

$$\int_a^c G(x) dF(x) = \int_a^b G(x) dF(x) + \int_b^c G(x) dF(x).$$

Αν τα εμπλεκόμενα ολοκληρώματα υπάρχουν

$$\int_a^b (G(x) + H(x)) dF(x) = \int_a^b G(x) dF(x) + \int_a^b H(x) dF(x),$$

$$\int_a^b G(x) d(F(x) + H(x)) = \int_a^b G(x) dF(x) + \int_a^b G(x) dH(x),$$

$$\int_a^b c \cdot G(x) dF(x) = \int_a^b G(x) d(c \cdot F(x)) = c \int_a^b G(x) dF(x),$$

$$\int_a^b G(x) dF(x) = G(b)F(b) - G(a)F(a) - \int_a^b F(x) dG(x).$$

Αν τα εμπλεκόμενα ολοκληρώματα υπάρχουν, και η F έχει παράγωγο F' σε κάθε σημείο στο $[a, b]$ τότε

$$\int_a^b G(x) dF(x) = \int_a^b G(x) F'(x) dx.$$

Κανόνες Cramer

Δίνονται οι εξισώσεις:

$$a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1$$

$$a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,n}x_n = b_n$$

Έστω ότι $A = (a_{i,j})$ και B ο πίνακας στήλη (b_i) . Τότε υπάρχει μοναδική λύση αν $\det A \neq 0$. Έστω ότι A_i είναι ο A με την i στήλη αντικατεστημένη από τον B . Τότε

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}.$$

Οι βελτιώσεις ισιώνουν δρόμους, αλλά οι στραβοί δρόμοι χωρίς βελτίωση είναι δρόμοι των ευφυών. – William Blake (The Marriage of Heaven and Hell)

Αριθμοί Fibonacci

00	47	18	76	29	93	85	34	61	52
86	11	57	28	70	39	94	45	02	63
95	80	22	67	38	71	49	56	13	04
59	96	81	33	07	48	72	60	24	15
73	69	90	82	44	17	58	01	35	26
68	74	09	91	83	55	27	12	46	30
37	08	75	19	92	84	66	23	50	41
14	25	36	40	51	62	03	77	88	99
21	32	43	54	65	06	10	89	97	78
42	53	64	05	16	20	31	98	79	87

Το αριθμητικό σύστημα Fibonacci: Κάθε φυσικός n έχει μοναδική αναπαράσταση

$$n = F_{k_1} + F_{k_2} + \dots + F_{k_m},$$

όπου $k_i \geq k_{i+1} + 2$ για όλα τα i , $1 \leq i < m$ και $k_m \geq 2$.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Ορισμοί:

$$F_i = F_{i-1} + F_{i-2}, \quad F_0 = F_1 = 1,$$

$$F_{-i} = (-1)^{i-1} F_i,$$

$$F_i = \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^i - \hat{\phi}^i),$$

Ταυτότητα του Cassini: για $i > 0$:

$$F_{i+1}F_{i-1} - F_i^2 = (-1)^i.$$

Προσθετικός κανόνας:

$$F_{n+k} = F_k F_{n+1} + F_{k-1} F_n,$$

$$F_{2n} = F_n F_{n+1} + F_{n-1} F_n.$$

Υπολογισμός με πίνακες:

$$\begin{pmatrix} F_{n-2} & F_{n-1} \\ F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n.$$